

Bezzi, 1908

Prof. MARIO BEZZI

1908

DITTERI ERITREI

RACCOLTI

dal Dott. ANDREINI e dal Prof. TELLINI

PARTE PRIMA

Seconda (1)

Diptera orthorrhapha.

Le raccolte fatte nell'Eritrea dai signori dottor Andreini e professor Tellini durante gli anni 1901-902, furono già oggetto di molte pubblicazioni che ne documentano la diligenza e la ricchezza. Io sono contento di aver potuto intraprendere, per la cortesia del dottor Senna e del professore Tellini, lo studio dei ditteri, che sono relativamente numerosi, e costituiscono certo la collezione più ricca che finora sia stata riunita di questa parte dell'Africa. Disgraziatamente gli esemplari non sono sempre ben conservati, o per la fragilità speciale di questi insetti, o per i metodi di conservazione che convenne porre in uso: intere serie di esemplari mancano delle antenne o di altre parti delicate. Tuttavia lo studio completo fu possibile nel maggior numero dei casi.

I tipi delle nuove specie qui descritte si trovano, o nel Museo degli invertebrati di Firenze, o nella raccolta del prof. Tellini di Udine, o, finchè mi fu possibile disporre dei duplicati, nella mia privata collezione in Torino.

Le pochissime pubblicazioni che si riferiscono alla Ditterofauna eritrea sono ricordate in altro mio lavoro. (1) Ho

(1) Boll. Soc. ent. ital., XXXIII, 4, (1907)

XXXIX (1907)

3-199

tinua, congiungendosi con quello delle altre) e di una larga fascia apicale grigia, che resta interrotta nel mezzo dalla linea mediana oscura. Piedi interamente di color giallo chiaro, con brevi peli neri. Ali lunghe e piuttosto strette; il secondo, terzo e quarto nervo sono pressochè paralleli fra di loro nell'ultimo tratto, e raggiungono l'apice dell'ala tutti pressappoco alla stessa distanza, gli ultimi due però distintamente più ravvicinati; nervi trasversali distanti fra di loro, il posteriore diritto, assai breve, e leggermente marginato di fosco.

249. *Drosophila melanogaster* Meig., 1830; Beck., Kat. pal. Dipt., IV. 220 (1905); Austen, Entom. monthly Mag., (2) XVI. 276. (1905). — *ampelophila* Loew, 1862. Beck., Kat. pal. Dipt., IV. 219. (1905). — *melanogaster* Macq. (nec Meig.), Dipt. exot., III, 258. (415) (1843) et Luc. Explor. Alg., Zool. III. 500. 268. (1843).

Staz. 289: Dintorni di Adi Caiè, Agosto 902. Andreini. È questa la piccola specie, così comune da noi nell'autunno, che il Rondani descrisse col nome di *uvarum*, dicendo di essa come al tempo della vendemmia si riscontrava a torme intorno alle vinacce. Essa è diffusa per tutta l'Africa, oltre che per l'America settentrionale; la *facialis* dell'Adams deve esser molto affine, se pure non la medesima.

Una femmina presenta le fascie addominali interrotte; il naso alla faccia è in questa specie molto ben distinto.

250. *Drosophila* sp. ind.

Sabarguma. Tellini.

Un esemplare mal conservato, di una specie verosimilmente nuova, coi bilanceri neri al di sopra.

Scaptomyza graminum Fall., 1823; Beck., Kat. pal. Dipt., IV. 223. (1905).

Staz. 289: Dintorni di Adi Caiè, Agosto 902. Andreini. Una femmina di questa specie, in tutto uguale ai nostri esemplari; essa fu già raccolta in Egitto dal signor Becker.

GEOMYZIDAE.

Cyrtotum fuscipenne Macq., 1843, Senegal, Camerun.

— *pictipenne* Thoms., 1858, Capo.

— *quadrinacula* Walk., 1849, Sierra Leone.

Geomyza frontalis Fall., 1823, Egitto.

— *pedestris* Loew, 1865, Egitto.

Opomyza quadrivitta Walk., 1849, Is. di Francia.

— *vicininervis* Macq., 1843, Africa.

Chiromyia flava L., 1758, Egitto.

— *latifrons* Loew, 1873, Canarie.

— *quadrinotata* Beck., 1904, Canarie.

OCHTHIPHILIDAE.

Ochthiphila inconstans Beck., 1903, Egitto.

— *sexnotata* Thoms., 1858, Capo.

Leucopis argentata Heeg., 1848, Egitto.

— *griseola* Fall., 1823, Egitto.

MILICHIIDAE.

Milichiella argentea Fabr., 1805, Is. Seichelles.

Milichia ludens Wahlhg., 1847, Egitto.

— *melaleuca* Loew, 1863, Transvaal.

— *parva* Macq., 1843, Is. Borbone.

— *speciosa* Meig., 1830, Canarie.

— *unicolor* Meij., 1906, Camerun.

7. *Desmometopa M. nigrum* Zett., 1848, Egitto, Camerun.
- — *niloticum* Beck., 1903.
8. — *tarsale* Loew, Egitto.
9. — sp. ind., Meij., 1906, Camerun.
10. *Meoneura obscurella* Fall., 1823, Egitto.
- — *prima* Beck., 1903.

252. *Desmometopa M. nigrum* Zett., 1848; Beck., Wien entom. Zeit., XXVI. 2. 2. (1907). — *niloticum* Beck. Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. 188. 330. (1903); Meij. Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 332. 4. (1906).

Staz. 198: Dintorni di Adi Ugri, Agosto 901. Andreini.
 Staz. 269, 291, 299: Dintorni di Adi Caiè, Giugno-Ottobre 1902. Andreini.
 Esempolari identici ai nostrali.

AGROMYZIDAE.

1. *Odinia tamaricis* Big., 1888, Tunisia.
2. *Rhodesiella tarsalis* Ad., 1905, Rodesia.
3. *Agromyza congesta* Beck., 1903, Egitto.
4. — *cunctans* Meig., 1830, Egitto.
5. — *metallica* Thoms., 1858, Is. Maurizio.
6. — *orbona* Meig., 1830, Egitto.
7. — *piliseta* Beck., 1903, Egitto.
8. — *pusilla* Meig., 1830, Egitto.
9. — *Schineri* Gir., 1861, Egitto.
10. — *squamata* Beck., 1903, Egitto.
11. — *tuberculata* Beck., 1903, Egitto.
12. *Domomyza nigripes* Schin., 1864, Egitto.
13. — *obscuritarsis* Rond., 1875, Egitto.
14. *Ceratomyza denticornis* Panz., 1806, Canarie.
15. *Aphaniosoma approximatum* Beck., 1903, Egitto.
16. *Leptometopa rufifrons* Beck., 1903, Egitto.
17. *Rhinoessa albosetulosa* Strobl., 1900, Egitto.
18. — *cinerea* Loew, 1862, Egitto.
19. — *longirostris* Loew, 1865, Egitto.

1. *Rhinoessa pallipes* Loew, 1865, Egitto.
- *pictipes* Beck., 1903, Egitto.
2. *Phytomyza affinis* Fall., 1823, Egitto, Algeria.
- *caffra* Macq., 1845, Caffreria.
- *flavicornis* Fall., 1823, Egitto.
- *obscurella* Fall., 1823, Egitto.

3. *Agromyza carbonaria* Zett., 1848; Beck., Kat. pal. Dipt., IV. 242. (1905).

Staz. 289: Dintorni di Adi Caiè, Agosto 902. Andreini.
 Una femmina uguale ai nostri esemplari.

4. *Phytomyza n. sp. ♀.*

Staz. 291: Dintorni di Adi Caiè, Settembre 902. Andreini.

Una specie assai interessante, che disgraziatamente manca alla testa. Affine pel colore alla nostra *flava* Fall., ma torace presenta tracce di linee longitudinali nere e l'ovosvitore è assai rigonfio.

CONOPIDAE.

A) CONOPINAE.

1. *Stylogaster complexa* Big., 1859, Port Natal.
2. — *leonum* Westw., 1850, Sierra Leone, Camerun.
3. *Conops aegyptiaca* Rond., 1850, Egitto.
4. — *africana* Rond., 1873, Fiume Anseba.
5. — *algira* Macq., 1869, Tunisi, Algeria.
6. — *antiqua* Wied., 1830, Egitto.
7. — *arabica* Macq., 1851, Arabia.
8. — *atra* Macq., 1843, Senegal.
9. — *aurata* Walk., 1871, Egitto.
10. — *bella* Ad., 1903, Rodesia.
11. — *biguttata* v. Röd., 1883, Canarie.
12. — *bimarginipennis* Karsch, 1887, Pungo Andongo.