

Czerny & Strobl, 1909

Spanische Dipteren III

- (241, I.) *pectoralis* Macq. Algeciras, San Fernando (Cz, -St), „Madrid (A)“.
- 1525. „*Nemopoda stercoraria* R.-D. Prov. Orense Galiciens (T).“
- 1526. „*Themira putris* L. Madrid (A).“
- (243, I.) *minor* Hal. Algeciras (Cz, St).
- (827, II.) *Saltella scutellaris* Fall. Algeciras (St).
- 1527. *Piophilila casei* L. Tarifa, Alicante (Cz).

Psilidae.

- (250, I.) *Psila rosae* Fabr. Algeciras (Cz, St), Villaverde (D).
- (249, I, II.) *rosae* var. *nigricornis* Mg. San Celoni, Montseny (St).
- 1528. „*rufa* Meig. Escorial (L).“

Agromyzidae.

- (314, I, II.) *Meoneura lacteipennis* Fall. Oberes Genital (St). 29. April → *Meoneura*
- (315, I, II.) „*vagans* Fall. Escorial (L).“
- (321, I, II.) *Domomyza frontella* Rond. (*obscuritarsis* Rond. und *luteitarsis* Rond.). Algeciras, oberes Genital, Elche, Jativa, Bobadilla, San Celoni, Malgrat (Cz, St).

Ich halte die drei angeführten Rondanischen Arten nur für eine Art. Alle von uns gesammelten Exemplare haben die von Rondani für seine *obscuritarsis* angegebene Körperfarbe: „*corpus nigrum subopacum, thorace paulo griseo*“; die kleine Querader steht auf der Mitte oder etwas jenseits der Mitte der Diskoidalzelle gegenüber der Mündung der ersten Längsader; die Fühler sind bald ganz schwarz, bald an der Wurzel rötlich, bald ganz rot und nur an der Spitzenhälfte des dritten Gliedes verdunkelt; die Farbe der Beine entspricht zumeist der Angabe Rondanis für seine *frontella*. Bei dem aus Bobadilla stammenden Exemplar sind die beiden Queradern verdickt.

Ob Macquarts *Agromyza cinerascens* als Synonym oder Varietät (Strobl, l. c.) hierher zu ziehen ist, wird ohne Kenntnis der Type immer fraglich bleiben, da Macquart über die Beschaffenheit der Randader keine Angabe macht.

- (322, I, II.) *nigripes* Schin. Algeciras, Tarifa, Moreda, Elche, Malgrat, Montseny, San Celoni, Montserrat (Cz, St).

- (356, I, II.) *ochripes* Meig. San Celoni (St).
 (357, I, II.) *andalusiaca* Str. Algeciras (Cz, St).
 (358, I, II.) *pusio* Zett. San Celoni, oberes Genital, Malgrat (St).
 (360, I, II.) *plumosa* Rond. San Pablo, oberes Genital (Cz, St).
 (361, I, II.) *fuscipennis* Hal. Algeciras, Elche (St).
 (893, II.) *crassimana* Hal. Algeciras, San Pablo, oberes Genital, San Celoni, Malgrat, Montserrat (Cz, St).
 (894, II.) *pumilio* Meig. (= *humida* Hal.). Bobadilla, Algeciras, San Pablo, Tarifa (Cz, St).
 1592. *sacra* Meig. Tarifa, auf *Ateuchus cicatricosus* Luc. (Cz, St), Malgrat (St).

Milichiidae.

Milichiinae.

- (310, I.) *Milichia* (*Lobioptera*) *albomaculata* Str. Elche (Cz), Alicante, Monistrol (St), „Escorial (L)“. Das bisher unbekannte ♀ hat einen einfarbigen gleißelnd bräunlichschwarzen Hinterleib. Stirnbreite gleich Augenbreite. Das ♀ dieser Art dürfte sich vom ♀ der *M. ludens* Wahlb. und *mixta* Beck. nur schwer unterscheiden lassen.

Madizinae.

- (246, I, II.) *Madiza glabra* Fall. Algeciras, Alicante, Malgrat, Monistrol (Cz, St).
 (311, I, II.) *Desmometopa M-nigrum* Zett. Algeciras, Tarifa, San Fernando, Alicante, Elche, Jativa, Encina, Monistrol (Cz, St).
 (876, II.) *latipes* Meig. Alicante (Cz).
 1593. *niveipennis* Str. (als *Siphonella* beschrieben), nach Strobl = *simplicipes* Beek., Wr. Entom. Zeit., 1907, S. 2. Alicante (Cz), Monistrol, Malgrat (St).
 1594. *Rhinoëssa cinerea* Loew. Algeciras, Alicante (Cz, St). Die von Strobl (301, I, II) für die Loew'sche *cinerea* ausgegebene Art ist nicht diese. Loew nennt die Backen „außerordentlich breit“. Tatsächlich entspricht auch die Breite der Backen an dem einzigen in Loew's Sammlung vorhandenen Exemplar fast dem vertikalen Augendurchmesser. Ich besitze Exemplare aus Venedig, die mit Loew's Type vollkommen übereinstimmen.