

Clasiopa Stenh.
 C. calcata Meig.
 C. glauca Stenh.
 C. plumosa Fall.
 Hydrellia Rob.-Desv.
 H. flaviceps Meig.
 H. griseola Fall.
 Pelina Halid.
 P. aenea Fall.
 Parydra Stenh.
 P. aquila Fall.
 P. coarctata Fall.
 P. fossarum Halid.
 P. litoralis Meig.
 P. pusilla Meig.
 P. quadripunctata Meig.
 Liomyza Macq.
 L. glabricula Meig.
 L. scatophagina Fall.
 Leucophenga Mik
 L. maculata Duf.
 Drosophila Fall.
 D. ampelophila Löw
 D. confusa Staeg.
 D. fasciata Meig.
 D. fenestrarum Fall.
 D. funebris Fabr.
 D. histrio Meig.
 D. melanogaster Meig.
 D. obscura Fall.
 D. phalerata Meig.
 D. transversa Fall.
 Scaptomyza Hardy
 Sc. graminum Fall.
 Cyrtonotum Macq.
 C. anus Meig.
 Diastata Meig.
 D. inornata Löw
 D. rufipes Meig.
 Tryptochaeta Rond.
 T. obscuripennis Meig.
 T. punctum Meig.

Opomyza Fall.
 O. florum Fabr.
 O. germinationis L.
 Balioptera Löw
 B. combinata L.
 B. pictipennis Rond.
 B. tripunctata Fall.
 B. venusta Meig.
 Anthomyza Fall.
 A. sordidella Zett.
 Chiromyia Rob.-Desv.
 Ch. flava L.
 Ch. oppidana Scop.
 Ochthiphila Fall.
 O. elegans Panz.
 O. juncorum Fall.
 O. polystigma Meig.
 Leucopis Meig.
 L. griseola Fall.
 Phyllomyza Fall.
 Ph. securicornis Fall.
 Meoneura Rond.
 M. obscurella Fall.
 Madiza Fall.
 M. glabra Fall.
 Odinia Rob.-Desv.
 O. boletina Zett.
 Agromyza Fall.
 A. abiens Zett.
 A. aeneiventris Fall.
 A. exigua Meig.
 A. maura Meig.
 A. nigripes Meig.
 A. pulicaria Meig.
 A. reptans Fall.
 A. Schineri Giraud
 A. vagans Fall.
 Ceratomyza Schin.
 C. acuticornis Meig.
 C. denticornis Panz.
 Phytomyza Fall.
 Ph. affinis Fall.
 Ph. albiceps Meig.

Ph. flavoscutellata Fall.
 Ph. latoralis Fall.
 Ph. obscurilla Fall.
 Ph. pullula Zett.

Familie: Conopidae.

Conops L.

C. flavipes L.
 C. insignis Löw
 C. quadrifasciata Deg.
 C. scutellata Meig.
 C. vesicularis L.
 C. vitellina Löw

Physocephala Schin.

Ph. fraterna Löw
 Ph. lacera Meig.
 Ph. pusilla Meig.
 Ph. rufipes Fabr.
 Ph. vittata Fabr.

Brachyglossum Rond.

B. brevirostrum Germ.
 B. capitatum Löw
 B. diadematum Rond.

Conopilla Rond.

C. ceriaformis Meig.

Myopa Fabr.

M. buccata L.
 M. dorsalis Fabr.
 M. fasciata Meig.
 M. occulta Wied.

M. polystigma Rond.
 M. testacea L.
 Occemyia Rob.-Desv.
 O. atra Fabr.
 O. distincta Wied.
 O. pusilla Meig.
 Zodion Latr.
 Z. cinereum Fabr.
 Z. notatum Meig.
 Sicus Scop.
 S. ferrugineus L.
 Dalmannia Rob.-Desv.
 D. punctata Fabr.

Familie: Hippoboscidae.

Hippobosca L.

H. capensis L.
 H. equina L.
 Ornithomyia Latr.
 O. avicularia L.
 O. fringillina Curt.
 Stenopteryx Leach.
 St. hirundinis L.
 Crataerhina Olf.
 C. pallida Latr.
 Melophagus Latr.
 M. ovinus L.

Familie: Braulidae.

Braula Nitzsch

B. coeca Nitzsch



Ein Tausendfuß im Kopfe eines Kindes.

Etwas kaum Glaubliches berichtet die „Soc. ent.“, indem sie schreibt: „Einem zwölfjährigen Mädchen wurde auf operativem Wege aus der Stirnhöhle ein lebender Tausendfüßler entfernt, der dem Kinde große Beschwerden gemacht hatte. Derselbe, Geophilus carpophagus, schien sich inmitten von Blut und Eiter ganz wohl zu befinden. Er war etwa 5 cm lang und ist vermutlich, während das Kind im Garten schlief, durch die Nase eingedrungen.“ —