

Gimmerthal, 184

with

Ld; 20237

4

736  
Part

95

Q60  
Ms

# BULLETIN

DE LA

# Société Impériale

## DES NATURALISTES

de Moscou.

TOME XX.

140-205

ANNÉE 1847.

N° III.



Moscou,

IMPRIMERIE SEMEN.

1847.

VIERTER  
BEITRAG  
ZUR  
DIPTEROLOGIE  
RUSSLANDS

VON  
B. A. GIMMERTHAL.

FAM. TIPULARIAE.

*CULEX LATERALIS* *Mgrl.*

*Bullet.* 1845. p. 290. 5.

Auch am Caucasus von H. D<sup>r</sup>. Kolenati mitgetheilt.

66.) *CHIRONOMUS SELLATUS.*

*Meig. VI* 255. 110. *Abthl. B. a.*

Ein ♀ aus Curland von Pstr. Kawall zur Ansicht gehabt.

Es stimmt mit Meigens Beschreibung des ♂ völlig überein. Taster und Fühler sind schwarz.

67.) *CHIR. ANNULIPES.*

*Meig. I.* 42. 51. *VI.* 244.

14  
An den vor mir habenden  
zur Ansicht erhaltenen  
Baus gelb. der Bauch  
Taster mehr bräunlich,  
schwebung.

68.) *CHIR.*

*Meig. I.* 39. 40.

Das ♀ das ich aus Cur  
nicht hatte, stimmte  
überein, bis auf die Sc  
plare ganz weiss wa  
braunen Knopf haben

*CHIR. VI*

*Bullet.* 1845. p. 307. n.

Auch um Charlow von

*CHIR. M*

*Meigens. I.* 47. 61.

Das ♂ in der Umgegend  
Kiew von H. Hochhut  
Manderstjerna erhalten

*CHIR. I*

*Bullet.* 1845. 325. 56.

Auch um St. Petersburg  
um Kiew von H. Ho

*CHIR.*

*Bullet.* 1845. p. 325.

Das ♀ vorigen Sommer

*MYZA SALTATRIX* Linn.

— *Bullet.* 1834. S. 432. 1842. S. 658.) —  
*b. Ent. syst. IV.* 341. 202. — *Tephr.* —  
 31. )

Abbildung wäre noch Folgendes hinzu-  
 an der Spitze, wie bei *nigriventris*  
 1. Vorderhüften ein ziemlich grosser  
 den Meigen an den Schenkeln nicht  
 den vier Vorderhüften nur ein sehr  
 Punkt: Ein ähnlich gefärbter Punkt  
 an den Schultern und an den Brust-

des Rückenschildes vorn und hinten  
 in der Mitte blassbraun.

Linien auf dem Rücken sind nach  
 durch eine feine gelbliche Linie

in Liv- und Curland sehr häufig im  
 Ural fand sie auch zwischen der Wol-

*A. RUFICORNIS* Macq.

(14.)

1. blass, die halbe Vorderstirn  
 2. oben und Scheitel schwarzbraun.  
 3. schwarz, etwas glänzend in ge-  
 4. graulich, irisierend. Schwinger  
 5. Hüften und Basis der Schenkel  
 6. letzte Fussglied an allen Füßen

7. H. Pastor Kawall zur Ansicht

Curland = Kurland = Lettland (ingl. = Latvia)

*Phylomyza*

2.) *ACROM. FLAVITARSIS* Meig.

(*Meig. VI.* 172. 14.)

Das ♀ aus Curland von Pastor Kawall zur Ansicht mit-  
 getheilt.

3.) *ACROM. PECTINATA* Meig. → *obscurata*

(*Meig. VI.* 179. 41.)

An dem aus Curland von Pastor Kawall zur Ansicht er-  
 haltenen ♀ war das Untergesicht dunkel braunroth,  
 wie auch die Stirn dicht über dem gelben Rande. Bei-  
 ne schwarz braun mit röthlichen Knien. Die 4<sup>te</sup> Längs-  
 ader sehr fein und unscheinbar.

1.) *BORBORUS NIGER* Meig.

(*Meig. VI.* 201. 6. — *Bullet.* 1834. S. 432.)

Das ♂ aus Curland von Pastor Kawall zur Ansicht ge-  
 habt. Prof. Eversmann fand sie zwischen der Wolga und  
 dem Ural.

2.) *BORBOR. NITIDUS* Meig.

(*Meig. VI.* 201.—4. *Tf.* 42. f. 18. *Bullet.* 1834. S. 432.)

An einem aus Curland von H. Pastor Kawall zur Ansicht  
 erhaltenen ♂, war das 3<sup>te</sup> Fühlerglied dunkelbraun,  
 die Schwinger rostgelb und die beiden ersten verdick-  
 ten Fussglieder an den Hinterbeinen rothbraun, sonst  
 alles wie in Meigen's Beschreibung. Prof. Eversmann  
 fand diese Fliege auch zwischen der Wolga und dem  
 Ural.

3.) *BORBOR. SUBSULTANS* Fb.

(*Meig. VI.* 200. 2. — *Bullet.* 1834. S. 432. 1842. S. 658.) —

(*Musca. Fab. Ent. syst. IV.* 326. 72. — *Callobata Syst.*  
*Antl.* 264. 17.) — (*Copromyza.* — *Fall. Heterom.* 7. 3.)