

93. *Hippelates pallidus* nov. sp. ♀. *Flavescens, abdominis apicem versus fuscō, calcari tibiarum posticarum longissimo.* — Long. corp. $1\frac{1}{2}$ lin., Long. al. $1\frac{1}{2}$ lin.

Flavescens, pube albida vestitus, triangulo verticali concolor, nitido, usque ad anticum frontis marginem producto. Articuli antennarum basales flavi; tertius deest. Setae thoracis perpacue nigricantes. Scutellum majusculum, superne planum, setis duabus marginalibus apicalibus nigris. Basis abdominalis flava; segmenta tria ultima marginesque laterales segmenti praecedentis ex nigro-fusca. Pedes pallidi, calcari nigro tibiarum posticarum longissimo. Alae hyalinae, venis subfuscis, prope basim alarum lutescentibus. — (Cuba; Gundlach.)

94. *Hippelates convexus* nov. sp. ♂ et ♀. *Niger, nitidus, capite flavo, triangulo verticali nigro, nitidissimo, abdominis basi fuscā; pedes lutei, femoribus praeter apicem, tibiis posticis praeter basim nigris, tarsis omnibus, basi tamen exceptā, fuscis.* — Long. corp. $\frac{3}{4}$ — $\frac{5}{6}$ lin., Long. al. $\frac{3}{4}$ lin.

Niger, nitidissimus. Caput flavum, occipite nigro; triangulum verticale magnum, nigrum, nitidissimum; antennae flavae, articulo tertio magnā ex parte nigro. Scutellum breve, convexiusculum. Abdomen nigrum, nitidum, basi fuscā vel sordide luteā. Pedes cum coxis anticis lutei, femoribus omnibus praeter basim nigris, tarsis praeter basim, posticis saepe totis fuscis. Halteres dilute flavatates. Alae hyalinae, venis fuscis. — (Cuba; Gundlach.)

95. *Hippelates flavipes* nov. sp. ♂ et ♀. *Ater nitidus, capite, praeter occiput et praeter triangulum frontale, abdominis basi, coxis pedibusque flavis, alis hyalinis.* — Long. corp. $\frac{2}{3}$ — $\frac{5}{6}$ lin., Long. al. $\frac{2}{3}$ — $\frac{5}{6}$ lin.

Ater, nitidissimus. Caput flavum, proboscide, palpis antennae concoloribus, tertio harum articulo interdum superne leviter nigricante, occipite et triangulo verticali nitidissimo atris. Basis abdominalis flava. Pedes cum coxis dilute flavi, tarsorum apice intedum paulo obscuriori. Halteres flavantes. Alae hyalinae, venis pallidis, costā et venā longitudinali primā dilutissime subfuscis. — (Cuba; Gundlach.)

96. *Desmometopa tarsalis* nov. sp. ♂ et ♀. *Atra, nitida, primo tarsorum anticorum primisque duobus reliquorum articulis ochraceis, halteribus lutescentibus, alis albido-hyalinis, venis pallidis, costā nigro-fuscā.* — Long. corp. $1\frac{1}{2}$ —1 lin., Long. al. $\frac{5}{6}$ lin.

Atra, nitida. Caput atrum, antennis, proboscide palpisque totis concoloribus; frons aterrima, opaca, triangulo verticali, marginibus lateralibus vittulisque duabus tenuissimis nigris. Thoracis dorsum et scutellum polline cinereo levissime aspersa. Pedes atri, primo tarsorum anticorum primisque duobus reliquorum articulis ex rufo ochraceis. Halteres lutescentes, capitolo supra interdum obscuriore. Alae albido-hyalinae, venis pallidis, longitudinalium tertiae et quartae apicibus modice sed perspicue convergentibus, costā nigro-fuscā. — (Cuba; Gundlach.)

Nota. *Agromyza* M atrum Meig. cum proxime cognatis genus proprium constituit, cui Desmometopae nomen imponere placuit.

97. *Loboptera lacteipennis* nov. sp. ♂ et ♀. *Atra, nitida, halteribus lutescentibus, alis albidis, venis concoloribus, longitudinalibus tertia et quartā valde convergentibus.* — Long. corp. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ lin., Long. al. 1— $1\frac{1}{2}$ lin.

Atra, nitida. Caput cum antennis, proboscide et palpis totum concolor, fronte subopacā. Thoracis dorsum et scutellum ex viridi atra. Abdomen subopacum, segmento ultimo toto lateribusque praecedentium nitidus. Halteres lutescentes. Alae albidae, venis concoloribus, costā dilutissime lutescente; segmentum ultimum venae longitudinalis quartae leviter arcuatū et cum venā tertia convergens, ita ut cellulae posterioris primae ostium angustissimum sit. — (Cuba; Gundlach.)

98. *Rhinoëssa coronata* nov. sp. ♀. *Cinerea, thorace obsolete fuso-lineato, fronte aurantiaca, utrinque albo-marginaliter, tertio antennarum nigrarum articulo subtus rufo, coxis anticis flavicantibus, coxis posterioribus pedibusque nigris.* — Long. corp. $1\frac{1}{4}$ lin., Long. al. $1\frac{1}{2}$ lin.

Occiput nigro-cinereum, albo-pollinosum. Frons aurantiaca, triangulo verticali cinereum, limbis lateralibus lunulaque frontalit albis. Primi duo antennarum articuli nigri, tertius supra niger, subtus flavus s. rufus; facies et genae latissimae subflavescentes, albo-pollinosae; setulas mystacinæ tenuissimæ et minutissimæ; palpi exalbidi. Thoracis dorsum ex fuso cinereum, lineis quatuor magis fuscis obsoletissimis. Scutellum concolor. Pleurae cinereae, supra late fuso-limbatae. Abdomen obscure cinereum, lateribus segmentorumque ultimorum marginibus posticis albido-cinereis. Coxæ anticæ flavantes, albo-pollinosæ, posticæ nigrae; pedes nigri, extremo femur apice tibiarumque basi luteo-testaceis, basi tarsorum intermedium fuscā. — (Georgia; Osten-Sacken.)