

fusca; unguis nigri; pulvilli pallidi: alæ subhyalinæ, iridescentes, costam versus subfulvæ; squamulæ et nervi fulva: halteres ferruginei.

Var. β. Femora omnia fusca.

Var. γ. Femora omnia fulva.

Taken at Port Famine in the Straits of Magellan.

76. SCIOMYZA FULVIPENNIS, n. s.

Mas. Fusco-ferruginea, abdomine obscuriore, alis fulvis.

Corp. long. $1\frac{1}{2}$ lin. Alar. $3\frac{1}{2}$ lin.

Fusco-ferruginea, pilis nigris hirta: caput anticè flavum: oculi rufo-fusci: os fulvum: antennæ fuscæ, basi fulvæ; articulus 4us niger, pubescens: abdomen fuscum, apice ferrugineum: pedes fulvi, pilosi; unguis nigri; pulvilli albidii: alæ fulvæ; squamulæ et nervi obscuriora: halteres albidii.

Taken at Port Famine in the Straits of Magellan.

77. TETANOCERA COSTALIS, n. s.

Ferruginea, antennis pedibusque obscurioribus, alis hyalinis sub costam fulvis.

Corp. long. $2\frac{1}{4}$ lin. Alar. $4\frac{1}{4}$ lin.

Ferruginea, setis nigris armata: caput posticè et inter oculos albo sericeum, anticè pallidè flavum: oculi rufo-fusci: antennæ fuscæ; articulus 1us et 2us pilis nigris hirti; 3us niger, pubescens, basi fuscus: thoracis latera et vittæ 3 vix conspicuæ dorsales albo sericea: abdomen ademptum: pedes obscurè ferruginei, setis nigris armati; unguis nigri; pulvilli albidii: alæ griseo-hyalinæ iridescentes, sub costam fulvæ; squamulæ et nervi fulva; nervi transversii fusci: halteres fulvi.

Taken at Port Famine.

M. Lichilla
78. GYMNOPA NITIDA, n. s.

Atra, nitens, alis albis.

Corp. long. $\frac{5}{8}$ lin. Alar. $1\frac{3}{4}$ lin.

Atra, nitens, pilis nigris hirta: oculi rufo-fusci: os nigrum: antennæ nigræ; articulus 4us pubescens: pedes nigri, pilosi: alæ albæ, iridescentes; squamulæ et nervi flava: halteres fulvi.

Taken at St. Catherine's.